Oxuuris

Inhaltsverzeichnis

- [1 Name](#)
- [2 Diagnostik](#)
- [3 Infektionszyklus](#)
- [4 Wurm](#)
- [5 Infektion](#)
- [6 Therapie](#)

Der Madenwurm, Springwurm, Pfriemenschwanz oder die Aftermade ist ein parasitischer Fadenwurm und der häufigste Eingeweidewurm, der weltweit, vor allem aber in den gemäßigten Klimazonen verbreitet ist. Die Art *Vermicularis* befällt Menschen, seltener Affen (in Tiergärten). 500 Millionen Infektionen sind weltweit pro Jahr zu verzeichnen, und zwar in sämtlichen Ländern und in allen sozialen Gruppen.

1 Name

[Enterobius vermicularis](#), [Fadenwürmer](#)

2 Diagnostik

Durch Kotproben die Frisch und spätestens nach ca. 16Stunden beim Tierarzt untersucht werden sollten.

3 Infektionszyklus

adulte Würmer leben auf der Dickdarmschleimhaut ? Weibchen wandern nachts durch den Spincter und legen in an der Perianalhaut mehr als 10.000 Eier ab (die Eier werden mittels eine stark haftenden Eiweißhülle "befestigt" ? bei Hauttemperatur schlüpfen die Larven nach 4-6 Stunden ? heftiger Pruritus ? nächtliches (unbewußtes) Kratzen ? Verteilung des Wurmes und der Eier mit den Händen ? akzidentielle Aufnahme ? Geschlechtsreife der Würmer nach 5-6 Wochen.

4 Wurm

Dicke: 2-5 mm

Länge: 9-12 mm

Eier:30 x 50 µm groß

Lebenserwartung: ca 100 Tage

5 Infektion

fäkal-orale Übertragung (Eier z.B. unter Fingernägeln, oder an Futtertieren), kontaminierte Gegenstände

- die Eier überleben in feuchter Umgebung 2-3 Wochen

6 Therapie

Reptilien Kundige Tierärzte geben hier Auskünfte, wir verzichten hier auf diese Auskunft um Missbrauch vorzubeugen!